

Přípravek **KALCIFOL Mg** je koncentrát přijatelného hořčíku a vápníku, určený k použití jako postřik všech kulturních plodin. Používá se při nedostatku vápníku a hořčíku (potlačování příznaků chlorózy z nedostatku vápníku a hořčíku), do porostů na těžkých, kyselých a podmačených půdách.



Doporučujeme použití v ovocných sadech (zejména u peckovin a jablek) především po odkvětu. Ve vinohradech od fáze uzavírání střapců nebo při projevech chlorózy. Zejména jařiny (jarní ječmen, jarní pšenice), ale i řepka, slunečnice, sója postižené chlorózou reagují pozitivně na dávku přijatelného vápníku a hořčíku.

Příznivý účinek dosahujeme při použití v porostech celeru, květáku, rajčat, okurek. Kombinace vápníku a hořčíku v jednom postřiku má příznivý vliv na pevnost buněčných stěn a průběh fotosyntézy zejména v kritických fázích růstu při zapojení porostu a během období stresu ze sucha nebo nadbytku srážek.

Působí velmi dobře proti hořké pihovitosti jablek a vrcholové hnilobě rajčat.

Důležitá je i aplikace cca 14 dní před sklizní, zvyšuje odolnost proti vzniku skladových chorob plodů ovoce a zeleniny.

Technické parametry

Dusík (N)	min. 6,5 hmot. %
Hořčík (MgO)	min. 6,5 hmot. %
Vápník (CaO)	min. 3,5 hmot. %
Železo (Fe) v chelátu s EDTA	min. 0,06 hmot. %
Další vlastnosti	
Reakce pH	6,0 až 8,0
Specifická hmotnost	1,22 - 1,33 g/cm ³

Rozsah a způsob použití

KALCIFOL Mg je určen k listové aplikaci v množství 2 – 4 l/ha do 150 – 300 litrů roztoku (0,6 - 2,6% postřikový roztok). Před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte mísitelnost jednotlivých složek roztoku.

Postřik je možné aplikovat v 14-21 denních intervalech. Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 5°C.

Listové hnojivo je možné kombinovat s herbicidy, fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení.



Balení: 10, 1000 litrů

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Platnost katalogového listu od 1. 1. 2018

